

**MET1181 Matematikk for siviløkonomer**  
**Høst 2020**  
**Oppgaver**

*... if I couldn't formulate a problem in economic theory mathematically, I didn't know what I was doing.*

R. Lucas

**Forelesning 10**

torsdag 8. okt. kl 8-9.45 i C1-010.

**Kap 3.11-13: Omvendte funksjoner. Eksponentialfunksjoner. Logaritmer.**

[L] 3.9.1-4	Midtveiseksamen 2015h oppg 14
[L] 3.10.1-2	Midtveiseksamen 2016v oppg 11
[L] 3.11.1-3	Midtveiseksamen 2016h oppg 13
[L] 3.12.1-5	Midtveiseksamen 2017v oppg 13
[L] 3.13.1-3	Midtveiseksamen 2018v oppg 13

**Repetisjon:**

- Midtveiseksamen 2015h oppg 9
- Midtveiseksamen 2016v oppg 9
- Midtveiseksamen 2016h oppg 7 og 8
- Midtveiseksamen 2017v oppg 7 og 8
- Midtveiseksamen 2018v oppg 8

**Oppgaver for veiledningstimene**

**torsdag 24/9 kl 10-15(!) i D1-065/70, CU1-067 (til kl 13) og C2-010, eller på Zoom**

**Oppgave 1** Anta  $g(x)$  er den omvendte funksjonen til  $f(x)$ . Bestem:

- a)  $g(10)$  hvis  $f(3) = 10$
- b)  $f(g(5))$
- c)  $f(\sqrt{2})$  hvis  $g(3) = \sqrt{2}$
- d)  $g(f(9))$

**Oppgave 2** Finn den omvendte funksjonen  $g(x)$  og definisjonsmengden  $D_g$  til funksjonen  $f(x)$  med definisjonsmengde  $D_f$ .

- a)  $f(x) = 2x - 3$  med  $D_f = \text{hele tallinjen}$
- b)  $f(x) = 0,5x + 1,5$  med  $D_f = \text{hele tallinjen}$
- c)  $f(x) = x^2 + 6x$  med  $D_f = \langle -\infty, -3 \rangle$
- d)  $f(x) = 20 + \frac{1}{x-3}$  med  $D_f = \langle 3, \infty \rangle$
- e)  $f(x) = (x-1)^3 + 50$  med  $D_f = [1, \infty)$

**Oppgave 3** Vi har (tilnærmet)  $\ln 2 = 0,6931$  og  $\ln 3 = 1,0986$  og  $\ln 5 = 1,6094$ . Bruk disse tallene til å finne verdiene (tilnærmet) uten å bruke ln-tasten på kalkulatoren.

- a)  $\ln 250$
- b)  $\ln 625$
- c)  $\ln \frac{625}{216}$
- d)  $\ln \frac{1000000}{27}$
- e)  $\ln 130 - \ln 78$
- f)  $\ln \sqrt[10]{6}$

**Oppgave 4** Løs likningene.

- a)  $e^x = 5$
- b)  $e^{2x+1} = 5$
- c)  $e^{2x+1} = 3e^{x+2}$
- d)  $\ln(x) = -2$
- e)  $\ln(7x-3) = -2$
- f)  $\ln(x-3) = \ln(2x+1) + 1$
- g)  $e^{2x} - 4e^x - 5 = 0$

**Oppgave 5** Løs ulikhetene.

- a)  $e^x \geq 5$                       b)  $e^{2x+1} \geq 5$                       c)  $\ln(x) < -2$                       d)  $\ln(x - 3) < -2$   
 e)  $\frac{3e^x}{e^x+1} < 5$                       f)  $\ln \frac{3x-2}{x-7} \geq 0$


**Oppgave 6** Finn asymptotene til funksjonen.

- a)  $f(x) = e^{-0.1x} + 23$                       b)  $f(x) = e^{x(10-x)} + 50$                       c)  $f(x) = \frac{100e^{0,04x}}{e^{0,04x}+50}$   
 d)  $f(x) = \ln(10 - x)$                       e)  $f(x) = \ln(x^2 - 400)$   
 f)  $f(x) = \ln(120x + 10) - \ln(20x - 30), D_f = \langle \frac{3}{2}, \rightarrow \rangle$

**Oppgave 7** Finn den omvendte funksjonen  $g(x)$  og definisjonsmengden  $D_g$  til funksjonen  $f(x)$  med definisjonsmengde  $D_f$ .

- (a)  $f(x) = e^{\frac{x}{3}} - 1$  med  $D_f = [0, \infty)$     (b)  $f(x) = 4 \ln(x - 10)$  med  $D_f = [11, \infty)$

**Oppgave 8** Bestem funksjonsuttrykket  $f(x) = c + \frac{a}{x-b}$  til hyperblene (a-d) i figur 1.



Figur 1: Hyperbler a-d

**Oppgave 9** Bestem asymptotene til hyperblene (a-d) i oppgave 8.

**Oppgave 10** Bestem asymptotene til de rasjonale funksjonene.

- a)  $f(x) = \frac{4x-10}{x-3}$                       b)  $f(x) = \frac{70-40x}{3-2x}$                       c)  $f(x) = \frac{3x^2-6x+8}{x^2+3}$   
 d)  $f(x) = \frac{4x^2-28x+40}{x^2-4x+3}$                       e)  $f(x) = \frac{x^2+3x+5}{x-7}$                       f)  $f(x) = \frac{x^3-8}{x^2-10x+16}$

**Oppgave 11** Avgjør om funksjonen  $f(x)$  har et nullpunkt i intervallet  $I$ . Tips: Skjæringssetningen!

- a)  $f(x) = \sqrt{x-2} - x + 3$  og  $I = [4, 5]$   
 b)  $f(x) = (x-5)\sqrt{(0,2x+5)} - 0,2(x-3)^2$  og  $I = [5, 15]$   
 c)  $f(x) = \frac{4x-10}{x-3} - 4$  og  $I = [2, 4]$



**Oppgave 7**

- a)  $g(x) = 3 \ln(x + 1)$ ,  $D_g = V_f = [0, \infty)$       b)  $g(x) = e^{\frac{x}{4}} + 10$ ,  $D_g = [0, \infty)$

**Oppgave 8**

- a)  $f(x) = -\frac{1}{5x}$       b)  $f(x) = 10 + \frac{1}{x-6}$       c)  $f(x) = 110 + \frac{6}{x-8}$       d)  $f(x) = 3 + \frac{2}{x-17}$

**Oppgave 9**

- a) vertikal asymptote:  $x = 0$ , horisontal asymptote:  $y = 0$   
 b) vertikal asymptote:  $x = 6$ , horisontal asymptote:  $y = 10$   
 c) vertikal asymptote:  $x = 8$ , horisontal asymptote:  $y = 110$   
 d) vertikal asymptote:  $x = 17$ , horisontal asymptote:  $y = 3$

**Oppgave 10**

- a)  $f(x) = 4 + \frac{2}{x-3}$  så vertikal asymptote:  $x = 3$ , horisontal asymptote:  $y = 4$   
 b)  $f(x) = 20 + \frac{10}{3-2x}$  så vertikal asymptote:  $x = \frac{3}{2}$ , horisontal asymptote:  $y = 20$   
 c)  $f(x) = 3 - \frac{6x+1}{x^2+3}$  så ingen vertikal asymptote, horisontal asymptote:  $y = 3$   
 d)  $f(x) = 4 - \frac{4(3x-7)}{(x-1)(x-3)}$  så vertikale asymptoter:  $y = 1$  og  $y = 3$ , horisontal asymptote:  $x = 4$   
 e)  $f(x) = x + 10 + \frac{75}{x-7}$  så vertikal asymptote:  $x = 7$ , skrå asymptote:  $y = x + 10$   
 f)  $f(x) = x + 10 + \frac{84}{x-8}$  så vertikal asymptote:  $x = 8$ , skrå asymptote:  $y = x + 10$

**Oppgave 11**

- a)  $f(x)$  har nullpunkt mellom  $x = 4$  og  $x = 5$  ved skjæringssetningen fordi  $f(4) = \sqrt{4-2} - 4 + 3 = 0,41 > 0$  mens  $f(5) = \sqrt{5-2} - 5 + 3 = -0,27 < 0$  og funksjonen er definert og kontinuerlig på hele intervallet.
- b)  $f(x)$  har nullpunkt mellom  $x = 5$  og  $x = 6$  ved skjæringssetningen fordi  $f(5) = -0,80$  mens  $f(6) = 0,69 > 0$  og funksjonen er definert og kontinuerlig på hele intervallet.  
 NB:  $f(15) = -0,52 < 0$  sammen med  $f(6) > 0$  forteller at  $f(x)$  har nullpunkt mellom  $x = 6$  og  $x = 15$ . Så  $f(x)$  har minst 2 nullpunkter på intervallet  $[5, 15]$ .
- c)  $f(x) = \frac{2}{x-3}$  har ingen nullpunkter på intervallet  $I = [2, 4]$  fordi likningen  $\frac{2}{x-3} = 0$  ikke har noen løsninger. NB: Vi kan ikke bruke skjæringssetningen selv om  $f(2) = -2 < 0$  og  $f(4) = 2 > 0$  fordi  $f(x)$  ikke er definert i hele intervallet (selv om  $f(x)$  er kontinuerlig for alle  $x$  der den er definert).